

Dans le cas de l'épilepsie, il se peut qu'un élève doit recevoir un médicament d'urgence, souvent le **Buccolam**, solution buccale qui doit être administrée dans la bouche, si la crise dure plus que 3 à 5 minutes. Il est important de lire le PAI (projet d'accueil individualisé) ou l'ordonnance médicale où le médecin indique à quel moment il faut donner ce médicament.

Voici une vidéo qui explique comment l'administrer :

Buccolam (English) → <https://youtu.be/nVKejKrMk84>

Que faire en cas de crise ?

Il est important que l'enseignant agisse calmement, qu'il rassure les autres élèves et reconforte l'élève qui a une crise. Une crise généralisée survenant à l'école peut être impressionnante : le calme de l'adulte rassurera les élèves.

- Veiller à ce que l'élève ne chute pas.
- Appeler l'infirmière au **499431-552 et / ou au 499431-1 (portière)**
- Si l'élève a des contractions musculaires répétitives, essayer de l'allonger par terre et mettre un coussin ou vêtement plié sous sa tête. Laissez la crise suivre son cours.
- Ecartez de lui tout objet susceptible de le blesser.
- Ne rien introduire en bouche, ni doigts, ni objets.
- Desserrez ses vêtements autour du cou.
- Tourner l'élève sur le côté, en position latérale pour faciliter la respiration.
- Évacuer les élèves de la salle de classe pour respecter la dignité de l'élève en crise.
- L'élève peut devenir pâle ou bleu tant que la respiration est suspendue, mais elle reprendra.
- Si la crise dure plus que **3 à 5 min.**, intervenir en fonction des modalités du PAI : p.ex. administrer le **Buccolam, solution buccale se trouve dans le sac de l'élève et / ou à l'infirmierie.**
- En absence de l'infirmière avertir les parents et appeler le **112.**
- S'il y a eu incontinence, couvrez l'élève d'un vêtement pour éviter qu'il ne soit gêné.

Après la crise attendez qu'il récupère ; il est souvent désorienté.

Extraits de la brochure « L'enseignant et son élève épileptique »,
A.A.P.E. Association d'Aide aux Personnes Epileptiques a.s.b.l.
(Dudelange)